



TRIOXISALENO

ANTIPSORIÁSICO

Sinonímia

Trissoralen, Trioxalen

Ação

Agente de pigmentação da pele, usado no tratamento do vitiligo e no aumento da tolerância da pele à luz solar.

Indicações

Para induzir a pigmentação em pequenas áreas vitiliginosas.

Posologia

Uso Interno

Vitiligo: via oral, 20 a 40mg/dia, 2 a 4 horas antes dos períodos controlado de exposição de UVA, 2 a 3 vezes/semana, com intervalo de 48 horas.

Aumento da tolerância a luz solar e pigmentação da pele: via oral, 20 a 40mg, 2 horas antes dos períodos controlados de exposição de UVA, 2 ou 3 vezes/semana (intervalo mínimo de 48 horas). Para este fim, o tratamento deve ser limitado em 14 dias de terapia, em tratamento contínuo ou intermitente.

Uso externo

No tratamento do vitiligo: aplicar nas manchas 1x/semana e expor à luz solar ou UVA por não mais que 1 minuto.

Reações Adversas

Reações mais freqüentes: prurido na pele, náusea, tontura, dor de cabeça, depressão mental. Sintomas de overdose ou super exposição a luz violeta: bolha e descamação da pele, rubor, ferida na pele, edema, especialmente nos pés ou pernas.

Contra-Indicações

Trioxisaleno é contra-indicado em pacientes com hipersensibilidade à droga. O risco/benefício deve ser avaliado em situações clínicas como: lupo eritematoso agudo, erupção polimórfica à luz, porfiria, xeroderma pigmentoso, afacia, catarata, câncer de pele.

Sugestão de Fórmula - Loção com Trioxisaleno

Trioxisaleno	1%	seguida de exposição à luz solar ou UVA, por não mais que 1 minuto. Logo após, recobrir os locais da aplicação com bloqueador solar.
Propilenoglicol	50%	
Álcool Etílico qsp	50 mL	
<i>Modo de usar</i>		
Aplicar	somente nas manchas vitiliginosas,	uma vez por semana,

Obs: as loções com **Trioxisaleno** devem ser empregadas sob supervisão médica e nunca entregues ao paciente para uso em casa.

Referências Bibliográficas

SWEETMAN, S.C; et al; MARTINDALE – Guia Completo de Consulta farmacoterapeutica. Barcelona. 2ª Ed. 2005.